

TC CON MEZZO DI CONTRASTO

ESAMI DA ESEGUIRE E PORTARE IN VISIONE

- Creatininemia
- GFR (Glomerular Filtration Rate)
- Elettrocardiogramma (ECG)

Tali esami sono validi se eseguiti nei 30 giorni precedenti l'esame.

Qualora la clearance stimata della creatinina (EGFR) sia inferiore a 30ml/minuto, l'esame con mezzo di contrasto non è indicato per l'elevato rischio di peggiorare la funzionalità renale, con conseguente danno renale da mezzo di contrasto.

Per valori di creatinina (EGFR) compresi tra 30 e 60 ml/minuto l'esame con mezzo di contrasto, qualora indicato, può essere effettuato previa adeguata preparazione, di seguito riportata:

- la sera prima della procedura : Citrato di sodio (Citrosodina bustine) 3 bustine in 500 cc di acqua;
- il mattino dell'esame : Citrato di sodio (Citrosodina bustine) 3 bustine in 500 cc di acqua;
- dopo la procedura: 2 lt di acqua nelle 24 ore successive.

Al momento della prenotazione La preghiamo di comunicarci eventuali patologie acute/croniche, fenomeni allergici e/o asma bronchiale, problemi al midollo osseo (es: anemia falciforme, mieloma multiplo e macroglobulinemia di Waldenstrom), feocromocitoma, eventuale esame programmato della tiroide con iodio, terapia con interleukina.

ATTENZIONE: Qualora Lei fosse in terapia con METFORMINA dovrà sospenderla 48 h prima dell'esecuzione dell'esame e riprenderla almeno dopo 48 h, previa consultazione del suo medico curante.

Il giorno dell'esame dovrà:

- Recarsi all'ora indicata con digiuno di 6 ore (può assumere acqua fino a 2 ore prima dell'esame);
- Portare gli esami preliminari richiesti;
- Portare in visione eventuali esami precedenti inerenti alla TAC da eseguire (Ecografie, Risonanza Magnetica, TAC, Radiografie, cartella clinica).

Dopo l'esame dovrà rimanere in osservazione presso il centro per almeno 15 minuti. Non è consigliabile guidare veicoli e utilizzare macchinari per un'ora dopo l'iniezione del mezzo di contrasto.